



## Calendario de prácticas sanitarias y de manejo bovino

### Región del NEA

Recomendaciones del Grupo Ganadería Subtropical del INTA Estación Experimental  
Agropecuaria (EEA) Corrientes

#### ENERO

- Finalizar el servicio. Completar en la primera semana, el retiro de los toros.
- En caso de ataques (mordeduras de murciélagos): se comienza la vacunación antirrábica, en todo el rodeo. Los que por primera vez se vacunan: se recomiendan dos dosis, separadas (una dosis día 1 y la 2<sup>da</sup> dosis a los 30 días). El resto de la hacienda: recibirá solo una dosis.

#### FEBRERO

- Organizar la reserva de potreros (sin pastoreo hasta inicios del invierno). Preparar los potreros para el invierno. Elegir, pastorearlos con buena intensidad (hasta eliminar la mayor cantidad de material maduro, para estimular el rebrote que será de mejor calidad) y/o quemar los potreros a reservar, cuidando de no afectar la condición corporal de los animales en pastoreo.
- Calcular las hectáreas necesarias para las vacas preñadas al tacto y la recría de vaquillas. Para vacas preñadas y vaquillas, se calculan 2 hectáreas por cabeza y para terneras de reposición, es decir, vaquillas de más de 7 meses de edad 1,5 ha por cabeza.
- Iniciar el control de toros. Análisis de Trichomoniasis, Campylobacteriosis, Brucelosis y Tuberculosis.
- Continuar con la vacunación Antirrábica.
- Planificar y preparar el destete.
- Iniciar la preparación de suelos para la siembra de verdeos de invierno como Avena o Raigrás.



## MARZO

- Diagnosticar la preñez por tacto (60 días post retiro de toros). Esta clasificación determinara el destino de cada categoría. El rodeo de vientres se presenta en dos grandes categorías:

Vacas sin cría al pie, (vaquillas de 1º servicio) y vacas secas.

A)

- Vacías (analizar y diagnosticar las fallas de la falta de preñez, para otorgar o no otra oportunidad en el próximo servicio) como así también analizar la conveniencia o no de:
  - ✓ Vacas vacías **gordas**: a venta.
  - ✓ Vacas vacías **flacas**: a invernada (en función del precio de alimento).
  - ✓ Vacas **preñadas**: a potreros reservados.
- Marzo es el mes más importante en la actividad ganadera, ya que se debería vender todo lo improductivo (descarte), puesto que existe una disminución del crecimiento de los pastos y estos deben ser resguardados para las demás categorías y no depender de insumos externos como, por ejemplo: forrajes: henos, como rollos o fardos o concentrados, como maíz y alimentos proteicos.

B)

- Vacas con cría al pie
  - ✓ Preñadas: a potrero reservado.
  - ✓ Paridas hasta octubre pasado, destetarlas.
  - ✓ Paridas fuera de época, destetar en mayo-junio.



- ✓ Vacías: cuidar y regular que no pierdan peso.
- ✓ Boqueo de vientres: realizar junto a la clasificación de tacto. Si tiene medio diente o menos:
  - a) preñadas: quedan hasta finalizar la crianza del ternero CUT (criando último ternero).
  - b) vacías: van a venta o en el caso de las flacas podrían ir a engorde o invernada.
  - c) Vacas ex CUT: van a invernada con o sin suplementación.
- Destete: Destetar a todos los nacidos, el año anterior (terneros con más de 4 meses). Las hembras de reposición como el caso de las terneras, se deberán desparasitar en abril y mayo con un bencimidazol. De ser posible realizar análisis de la bosta para conteo de parásitos y especificidad. Consultar con el médico veterinario de la zona o a la agencia de INTA más cercano.

### ABRIL

- Continuar con la preparación de los descartes para venta antes del invierno.
- Realizar evaluación clínica y análisis (control) de trichomoniasis, campylobacteriosis y brucelosis en toros (3 raspados mínimo). Prever reposición de los descartados.
- Vacunar vientres preñados, contra diarrea neonatal (opcional y preventivo). Las que son vacunadas por primera vez: dos dosis separadas, (una dosis día 1 y la 2<sup>da</sup> dosis a los 30 días). El resto de los vientres: una dosis.
- Siembra de verdeos de invierno.



## MAYO

- Pesar las hembras de reposición (destete hembra). Si hay excedentes, vender las más livianas. En mayo, deberían pesar más de 170 kg para lograr el entore a los 24 meses de edad. A su vez, se necesitará suplementar con 300 a 400 gr de proteína (alimentos como semilla de algodón, expeler de algodón o de girasol), para lograr un buen crecimiento y desarrollo del futuro vientre y que alcance su peso adecuado en el primer servicio (75-80 % del peso adulto de la madre ej.: peso madre 400 kg, peso adecuado más de 300 kg).
- Pesar las vaquillas de 1 a 2 años. En este mes ya debería estar con el peso cercano al de entore. En caso contrario, planificar una suplementación proteica para ganancias de 300 a 400 grs/día o energético-proteicas con ganancias de más de 400 grs/día, según los días, para el inicio de servicio y de ser posible, que sea 30 días antes del rodeo general. En el caso de alcanzar el peso de entore, controlar el estado durante el invierno. Objetivo: No deben perder peso.

### Fines de mayo

- Realizar la separación de las primeras vacas a parir a principios de junio-julio. Las mismas van a potreros de parición. Para realizar recorridas periódicas.
- Se utilizarán los primeros potreros reservados en otoño.



## JUNIO

- Parición, nacimiento de terneros: curar ombligos de los recién nacidos y llevar registro de cada ternero y madre (aplicar 1 cc de doramectina-DECTOMAX). En rodeos comerciales, se puede castrar los machos, al mes de nacidos y vacunar contra neumoenteritis.
- Utilizar los potreros reservados en otoño, para los vientres paridos.
- El personal de campo encargado del control de las pariciones, deben portar en su maleta, los medicamentos adecuados para el control sanitario y realizar reportes de los terneros semanalmente.
- Recorrer 1 a 2 veces por semana, controlando los vientres preñados existentes.

## JULIO

- Sigue la parición.
- Identificar los lotes paridos hasta fines de julio, para posibilitar el destete precoz de las “cabezas”.
- Prever vacunación de los toros y vientres contra:
  - ✓ Campylobacteriosis (Vibriosis)
  - ✓ Leptospirosis
  - ✓ IBR y BVD: estas vacunas se hacen en vacas paridas, vacías o vaquillas de dos años (según laboratorio de origen existen vacunas combinadas).
- Planificar la implantación de pasturas/cultivos (elección de los sitios, superficie, especies y preparación de suelo (1<sup>ra</sup> pasada de arado).



## AGOSTO

- Preparar los vientres para el servicio. El mismo se iniciará el 1º de septiembre. Separar por raza y/o cruza.
- Continuar la vacunación contra campylobacteriosis, etc.
- Aplicar a los vientres y toros una dosis de vitamina A, D y E.
- Preparar lotes para siembra de pasturas. Planificar la implantación de pasturas/cultivos (elección de los sitios, superficie, especies y preparación de suelo (2<sup>da</sup> pasada de rastra).

### Fines de agosto

- Preparar los potreros de campo natural y/o pasturas, para los terneros que serán destetados precozmente.

## SETIEMBRE

- Iniciar el servicio de primavera comenzando con las vaquillas, vacas secas y parición “cabeza”.
- Practica de destete precoz: planificar el mismo, preparar para el destete. Identificar a los nacidos hasta fines de septiembre, para el segundo lote de destete. Completar la compra de raciones y comederos. Preparar los potreros, sombras aguadas, etc.
- Vacunar todo el rodeo, incluyendo los terneros de más de 3 meses, contra Carbunco. Los terneros de 3 meses o más y la recria de sobreaño, también se vacunan contra Mancha y Gangrena gaseosa, (actualmente se las denomina poliostridiales).
- Seguir enviando vientres a servicio.
- Inicio de venta de vacas gordas (si fueron suplementadas en invierno).



## OCTUBRE

- Finalización de pariciones.
- De acuerdo a las lluvias y temperatura del suelo (más de 18 °C); siembra de pasturas/cultivos sorgo-maíz.
- En vacas flacas, realizar el destete precoz. Se destetan precozmente los nacidos en junio -julio. Controlar el peso, no menor a 70 Kg y no menos de 60 días de edad, se desparasitan y se continúa mensualmente.
- Previo al destete, se vacunan los terneros contra: Queratoconjuntivitis, IBR, BVD Y Pi3. Se tratan de dos dosis: una anterior al destete y la 2<sup>da</sup>, 10/20 días luego del destete.

## NOVIEMBRE

- Completar vacunación contra Mancha y Carbuncho.
- Se destetan precozmente los nacidos en agosto y mediados de septiembre. Controlar el peso, no menor a 70 kg. Ídem vacunas y antiparasitarios.
- Buscar compradores para el destete macho de marzo del año siguiente.

## DICIEMBRE

- Dar una dosis de antiparasitarios a todos los terneros al pie de la madre.
- A fines de diciembre: sacar todos los toros de los rodeos de servicio.
- Buscar compradores para el destete macho de marzo.

### Otras tareas a tener en cuenta:

- Baños contra garrapatas: cada vez que sea necesario o de acuerdo a los requerimientos de SENASA y COPROSA\*.



Ministerio de Agroindustria  
Presidencia de la Nación

- Tratar contra “mosca de los cuernos”, 3 / 4 veces durante la época de infestación, según necesidad. Se puede combinar con el punto anterior.
- Antiparasitarios para la recría: 2 a 4 veces por año según infestaciones.
- Baños contra sarna y piojos. Según necesidad en otoño.
- Suplementación mineral: todo el año a todo el rodeo, a voluntad. Partes iguales de Cenizas de huesos y sal común.
- Antiparasitarios a terneros destetados precozmente, mensualmente.

**TENER EN CUENTA LAS FECHAS DE VACUNACION CAMPAÑA ANTIAFTOSA Y BRUSELOSIS.**

**Controlar la disponibilidad de suplemento mineral (fosfora 6%, calcio 12% y cloruro de sodio) se trata de una inversión y los resultados son más que positivos (todo el año).**

<sup>1</sup> Ing. Agr. Juan José Verdoljak

[verdoljak.juan@inta.gob.ar](mailto:verdoljak.juan@inta.gob.ar) Tel. Cel. 11 6800-1731

<sup>2</sup> Ing. Agr. Luis Gándara [gandara.luis@inta.gob.ar](mailto:gandara.luis@inta.gob.ar) Tel. Cel. 11 6797-8798

<sup>3</sup> Ing. Agr. María Mercedes Pereira [pereira.maria@inta.gob.ar](mailto:pereira.maria@inta.gob.ar) Tel. Cel. 11 3085-9177

