


# EL DESTETE TEMPORARIO

Dr. Carlos Robson  
crobson@correo.inta.gov.ar

Grupo Producción Animal  
EEA Mercedes - Centro Regional Corrientes  
Tel. /Fax: 03773 - 420392  
www.inta.gov.ar/mercedes

[www.produccion-animal.com.ar](http://www.produccion-animal.com.ar)

Volver a: [Amamantamiento](#)



El destete temporario es una herramienta de manejo que nos permite mejorar la eficiencia reproductiva de nuestro rodeo. Consiste en interrumpir el amamantamiento por medio de la colocación de un dispositivo denominado lata o mascarilla de destete en los ollares del ternero. Durante este período (alrededor de 14 días), el ternero permanece siempre al pié de la madre y luego del retiro del dispositivo, vuelve a mamar normalmente.

## Fundamento del Enlatado

La supresión amamantamiento por períodos cortos permite aumentar la tasa de celo y preñez.

Al igual que el destete precoz, el enlatado se utiliza para incrementar el porcentaje de preñez. Sin embargo, cada alternativa debe implementarse teniendo en cuenta el estado corporal de los animales:

**Vacas en Estado Corporal Muy Pobre**

**Destete Precoz**

**Vacas Estado Corporal Regular**

**Destete Temporario**

### Técnica del Enlatado

La primera tarea a realizar es la individualización de los terneros a enlatar. Primero debe separarse las vacas de sus terneros. Luego, se realiza la determinación de la condición corporal para decidir a qué animales aplicaremos el tratamiento. Una vez seleccionados, se introducen en la manga y cepo se les pinta la ubre. Se debe pintar la zona donde el ternero cabecea en el momento de mamar. Después de esto se juntan vacas y terneros en un piquete cercano y se espera el tiempo suficiente para que los terneros puedan mamar y pintarse.

Una vez cumplidos los pasos anteriores sólo los terneros vuelven a la manga y se colocan las mascarás a aquellos que tengan pintura en la cabeza.

### Duración del enlatado

El período óptimo de enlatado es de 14 días. En este lapso de tiempo las vacas responden favorablemente y lográndose incrementos de 10 a 15 puntos porcentuales de preñez. Los terneros pierden alrededor de 10 kg durante el enlatado, hecho que debe mencionarse como costo de la implementación de la técnica.



Volver a: [Amamantamiento](#)