

# RUTER, SISTEMA DE ALIMENTACIÓN PARA LA CRIANZA DE TERNEROS DE TAMBO

A.C.A., Asociación de Cooperativas Argentinas. 2003.

[www.produccion-animal.com.ar](http://www.produccion-animal.com.ar)

Volver a: [Destete](#)

## INTRODUCCIÓN

El Sistema y el alimento RUTER demuestra que una dieta sólida suministrada de una determinada manera, logra desarrollar totalmente el rumen, en un lapso de tiempo mucho más breve que los sistemas de Crianza tradicionales. Permitiéndole al productor prescindir total y absolutamente de la leche entre los 14 y 17 días de Crianza. Logrando una breve y armoniosa transición de lactante a rumiante.

### Esto se logra por:

- ◆ El desarrollo total de las papilas ruminales en 15 días.
- ◆ El crecimiento exponencial de las poblaciones bacterianas y protozoarias.
- ◆ El desarrollo físico completo del rumen.
- ◆ El crecimiento en concordancia de todo el sistema enzimático intestinal, encargado de degradar y absorber los nutrientes.
- ◆ el crecimiento en concordancia de la porción endócrina y exócrina del páncreas.

### Garantizándole al productor:

- ◆ Desleche entre los 14 y 18 días de Crianza.
- ◆ Rumen de una animal de 5 meses a los 35 días de vida.
- ◆ Menores incidencias de diarreas.
- ◆ Menor Morbilidad y Mortalidad.
- ◆ Mejores ganancias de peso.
- ◆ Excelentes índices de conversión de materia seca.
- ◆ Un rumiante más eficiente.

### Brindándole la posibilidad de:

- ◆ Usar como dieta láctea ÚNICAMENTE CALOSTRO, eliminando el costo de leche.
- ◆ Ingresar a las recrias a los 45 días de vida.

Ruter es la Nutrición con tecnología de punta mundial para obtener la MEJOR CRIANZA DE SUS TERNEROS, siguiendo estos simples pasos.

## INDICACIONES DE USO

El producto se suministra solo o mezclado con leche. Para acostumbrar al animal, se aconseja mezclarlo con la leche los primeros 2/3 días de crianza, a razón de 100 grs. por litro de leche hasta alcanzar el consumo total de la ración diaria recomendada. De esta manera se logran rápidamente los consumos recomendados en la tabla de suministros.

Dado que el alimento tiene poca humedad, es normal que el animal ingiera mayor cantidad de agua luego del desleche, por lo que debe asegurarse de que disponga de agua limpia y fresca en todo momento, no debiendo superar nunca los 6 litros diarios durante el primer mes de crianza.

Se debe suministrar en dos o tres comidas diarias (dependiendo del clima). El consumo orientativo estimado debe ser para cada semana de crianza el recomendado por la tabla de consumo.

**TABLA DE CONSUMO (POR TERNERO)**

| Días de crianza | Dieta Láctea |       | Dieta Sólida |             | Rollo/Fardo       | Agua         |
|-----------------|--------------|-------|--------------|-------------|-------------------|--------------|
|                 | Consumo      | Forma | Ruter        | Arranque    |                   |              |
| 0-7             | 4 lt.        | 2+2   | 200 gr/día   | No          | No                | 2 lt.(máx)   |
| 8-14            | 4 lt.        | 2+2   | 400 gr/día   | No          | No                | 2 lt.(máx)   |
| 15-21           | No           | No    | 800 gr/día   | No          | No                | 4/6 lt.(máx) |
| 22-28           | No           | No    | 1000 gr/día  | No          | Sí (a discreción) | 4/6 lt.      |
| 29-35           | No           | No    | 1000 gr/día  | 500 gr/día  | Sí (a discreción) | 6 lt.        |
| 36-45           | No           | No    | 500 gr/día   | 1000 gr/día | Sí (a discreción) | 8 lt.        |
| 46-56           | No           | No    | No           | 1500 gr/día | Sí (a discreción) | a discreción |

**INGREDIENTES**

Maíz - Trigo - Harina de Vísceras de Aves - Suero de Queso - Leche Entera - Leche Descremada - Soja Micronizada - Pellets de Soja - Arroz - Gluten Meal - Fosfatos Mono y Dicálcicos - Metionina - Lisina - Treonina - Monensina - Vitaminas y Minerales

**COMPOSICIÓN CENTESIMAL**

| Parámetro          | % sobre sustancia tal cual |
|--------------------|----------------------------|
| Proteínas (m-in.)  | 25                         |
| Grasa (mín.)       | 8                          |
| Fibra Bruta (máx.) | 3                          |
| Humedad (máx.)     | 10                         |
| Ca (mín./máx.)     | 1,1 - 1,6                  |
| P (mín./máx.)      | 1,1 - 1,3                  |
| Cenizas (máx.)     | 7                          |
| Metionina (mín.)   | 0,5                        |
| Lisina (mín.)      | 0,8                        |
| Treonina (mín.)    | 0,7                        |
| Monensina (máx.)   | 0,015                      |

**INSTRUCTIVO**

| Dieta           | Semana  |                              |   |  |  |                    |   |
|-----------------|---|------------------------------|---|--|--|--------------------|---|
|                 | 1er   | 2da                          | 3era  | 4ta  | 5ta  | 6ta                | 7ma                                     |
| Leche Sustituto | 4 lts. en 2 tomas   | 4 lts. en 2 tomas            | Suspender   |  |  |                    |   |
| Ruter           | 200 grs. por día  | 400 grs. por día             | 800 grs. por día                                    | 1000 grs. por día                                      | 1000 grs. por día  | 500 grs. por día   |   |
| Arranque Ración |   |                              |   |  | 500 grs. por día   | 1000 grs. por día  | 2000 grs. por día                       |
| Rollo Fardo     |   |                              |   | Discreción   | Discreción   | Discreción         | Discreción                              |
| Agua            | 2 lts. por día  | 2 lts. por día               | 4 a 6 lts. por día                                  | 4 a 6 lts. por día                                     | 6 a 8 lts. por día   | 6 a 8 lts. por día | 6 a 8 lts. por día                      |
| Observ.         | Controlar el calorizado.<br>Desinfectar el ombligo<br>Para facilitar el consumo de Ruter agregue 100 grs. por litro de leche las primeras 4 tomas | Controle el consumo de Ruter | Desleche, al alcanzar los 400 grs. por día de Ruter | No suministrar más de 6 lts. de agua por día y ternero | A partir del día que el ternero se come 1 kg. de Ruter agregar 500 grs. de arranque o su ración para terneros. Comenzar a incorporar rollo o fardo a la dieta. |                    | Puede incorporar su ternero/a a Recría. |

Volver a: [Destete](#)