

DESTETE HIPERPRECOZ CON PREINICIADOR

Maura Ravenna*. 2014. Engormix.com.

*Gerente de Marketing, Depto. Técnico Conecar.

www.produccion-animal.com.ar

Volver a: [Destete](#)

INTRODUCCION

El presente trabajo tiene como finalidad presentar información acerca de una experiencia a campo de un proceso de destete realizado en un establecimiento ganadero importante de la zona de una superficie de 25mil hectáreas ubicado en la región noreste de la provincia de Salta con un stock de 12mil vacas de cría.

El establecimiento en cuestión se presentaba en estado de emergencia, debido a la fuerte sequía que aquejaba a la región con sus vacas en un bajo estado corporal con terneros al pie, y con riesgo de no solo lograr bajos índices de preñez sino de aumentar la mortandad del par vaca ternero por falta de comida. Debido a lo anteriormente descrito, el establecimiento ha decidido efectuar un destete hiperprecoz masivo de aproximadamente 2500 terneros/as en un lapso de 10 días para así conformar 13 corrales con capacidad de 200 cabezas cada uno.



Esta tecnología ya probada, tiene como finalidad bajar abruptamente los requerimientos de la vaca apartando el ternero del pie de la madre para así mejorar su estado corporal y lograr óptimos índices de preñez, que en este caso particular la finalidad no solo está ligada a la preñez sino a la vida de la vaca, ya que se registraron mortandades elevadas debido a la falta de oferta forrajera.

Debido a los altos requerimientos y stress de la categoría afectada al destete, se debe orientar una base alimenticia de alta palatabilidad y alto valor nutricional (+Energía +Proteína) que replazce la leche materna y comience a desarrollar el rumen precozmente para así poder procesar la fibra de manera más eficiente a una temprana edad.

El producto en este caso probado es el Preiniciador Ternero CONECAR, que tiene como indicación los objetivos mencionados, por su alto valor nutricional, palatabilidad, y presentación.

Los datos tomados en este trabajo reflejan los animales del primer corral destetado que se pesaron el día 1 y el día 28 de iniciado el destete, registrando además datos de consumo de alimento, mortandad y conversión alimenticia.

PESAJE INICIAL

Pesaje Individual Inicial:

Se pesaron un 10% del primer grupo destetado arrojando un **promedio de 27kg** con máximos y mínimos en 46 y 22kgs respectivamente (pesos por debajo del indicado para el destete hiperprecoz).



ALIMENTACION:

ALIMENTACION DE LAS ETAPAS DEL DESTETE				
DIAS	Producto Usado	Consumo Real		
		DIA 10	DIA 20	DIA 30
0 a 10	PREINICIADOR	800gr		
11 a 15	PRE + INICIADOR 18%	6 días Transición		
16 a 20	INICIADOR 18%		1200gr	
21 a 22	INI + CONC (30% + Maiz)	Buena Transición		
23 a 30	CONC (30% + Maiz)			1500gr



RESULTADOS

Ganancia Individual Promedio:

Ganancia Diaria de Peso en 28 días (Kg)		
Pesaje Inicial	Pesaje Final	Ganancia Diaria
27	48.8	0.779

Mortandad:

Mortandad	
Animales Totales	2500
Muertos Totales	128
% Mortandad	5.12

Observaciones: 30% de la mortandad total fue producto del traslado hasta los corrales (1ros días de arribo).

Conversión Alimenticia Individual:

		Consumos Aproximados en 28 días (Kgs)			
		PREINICIADOR	INICIADOR	CONC. 30%+Maiz	FARDO
Consumo Total	38.95	8	10	11.15	9.8
Ganacia Total	21.8				
Conversion Tal Cual (Kgs Racion para 1 kg Carne)	1.787				

Observaciones: La conversión alimenticia resulta ser muy buena en esta etapa, por la calidad de alimento ingerido y su traducción a aumentos diarios altamente satisfactorios.



[Volver a: Destete](#)