

ALTERNATIVA AL DESTETE PRECOZ: SUPLEMENTANDO A LA VACA

Santiago Da Cunda. 2017. Fororural 12.11.17.
www.produccion-animal.com.ar

[Volver a: Destete](#)

INTRODUCCIÓN

Una alternativa para mejorar el porcentaje de preñez, con suplementación energética-proteica a la vaca y no al ternero.

Ésta alternativa logra sustituir al destete precoz en ciertas categorías, pudiéndose utilizar conjuntamente con el destete temporario. Esto significa que al momento de realizarle el destete temporario al ternero, se suplementa la vaca, lo cual presenta un costo significativamente menor, ubicándose en torno a un 30-40% del costo de un destete precoz.

Dicha técnica tiene los mismos objetivos que el destete precoz, pero sus resultados han sido menores, principalmente en vaquillonas que se encuentren en anestro profundo, siendo no recomendable la utilización en primíparas de mal estado corporal, por debajo de 3,5 de CC.

Por otra parte, las grandes ventajas que presenta éste sistema no son solo económicas, sino también la sencillez y practicidad para aplicarlo, ya que se suplementa directamente a la vaca.

Las principales categorías a suplementar en este caso serían vacas multíparas de menor estado corporal, o vacas primíparas con un estado corporal mayor a 3.5, donde a pesar de que se encuentren en un anestro superficial o profundo, a través de esta suplementación, pueden comenzar a ciclar, y así preñarse y adelantar su fecha de preñez.

Lo importante a destacar es que es una tecnología simple, con requerimientos de volumen significativamente bajos, ya que se suministran aproximadamente 1.5 kg de suplemento por vaca por día, durante un período de aproximado de 45 días.

Es de gran importancia destacar que no solo fue comprobada por lo investigación, sino que también fue desarrollada en varios establecimientos comerciales y los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios.

En mi opinión son técnicas que además de ser muy económicas, tienen una facilidad de implementación y manejo, que las vuelve muy atractivas, por lo que de a poco se van extendiendo y masificando cada vez más.

CÓMO LO IMPLEMENTAMOS

El momento ideal para iniciar la técnica sería cuando el ternero tiene alrededor de 45-50 días, pero teniendo en cuenta que una población de vacas paren en un rango de 60 a 90 días, lo recomendable sería estratificar por lo menos en dos lotes, e iniciar cada uno cuando la media de los teneros tiene entre 65-70 días.

Los primeros 10 días, se le brinda un consumo relativamente bajo a la vaca, que puede variar entre 750 grs a 1 kg por vaca.

En los posteriores 11-14 días, se debería realizar el destete temporario del ternero y conjuntamente, mientras el ternero está con tablilla, la vaca continúa comiendo en el orden de 1,5 kg por día.

Luego de retirado la tablilla, la vaca continúa consumiendo el alimento 20 días más, en este caso, con un suministro diario de entre 1,5 a 2 kg hasta que se retira el suplemento.

De esta forma, logramos hacerle un flushing a los animales, o sea un gran aporte de energía y proteína, que hace que la vaca inmediatamente recupere su actividad y entre en celo.

QUÉ ALIMENTOS UTILIZO

El tipo de alimento a utilizar es fundamental y en ellos radica gran parte del éxito, ya que es necesario que sean alimentos muy energéticos, de más de 3,5 Mcal de energía metabolizable, y proteicos de más de 22% de proteína, con alta calidad de ingredientes utilizando básicamente maíz, aceite vegetal, harina de soja y una concentración muy elevada de minerales tales como zinc, selenio y cobre, que están asociados básicamente a toda la etapa reproductiva del animal.

[Volver a: Destete](#)