

SP 27 Destete precoz a fecha fija en campo natural. 2. Ganancia de peso de los terneros (Comunicación). **Rinaldi, C.** Unicampo Uruguay SRL. Asesoramiento privado. Paysandú, Uruguay. unicampo@adinet.com.uy

A fixed date early weaning in native grassland. 2. Weight gain of the early weaned calf (Communication)

En el Uruguay el porcentaje de destete del rodeo de cría se sitúa históricamente en 63%. El destete precoz permite superar sustancialmente este guarismo. Comercialmente se ha recomendado aplicar esta técnica a terneros de más de 2 meses de edad y/o 70 kg de peso vivo (PV), así como realizarlo sobre praderas. Dada la composición de los rodeos de cría y la eficiencia reproductiva de cada categoría que lo componen, la dispersión de las pariciones hace que más del 30% de los terneros no logren esas condiciones al inicio del entore (cola de parición). Ello limita la aplicación masiva de la técnica y por ende una mejora impactante de los indicadores reproductivos del rodeo. Con el objetivo de evaluar la ganancia diaria de peso (GDP) de terneros destetados precozmente a fecha fija aún cuando no cumplen con las condiciones de peso, edad y base forrajera recomendadas, se registró y analizó información de rodeos comerciales asesorados en el marco del Proyecto Ganadero (MGAP-BID). Un total de 843 terneros y terneras provenientes de 42 rodeos fueron identificados al nacer. El 1º/12/2003 se inició el entore en todos los rodeos y los terneros fueron pesados en horas de la mañana sin ayuno previo y destetados definitivamente. Los terneros fueron agrupados por rangos de peso. La alimentación consistió en el suministro de una ración comercial (Registro MGAP N° 7725) de 17% de PC, 6% de FC y 2.6 Mcal EM con encierro durante 10 días hasta que consumieran 1 kg de ración por animal por día. Luego pastorearon campo natural y se les siguió suministrando 1 kg de ración hasta la finalización de las cantidades asignadas *a priori*. En el Cuadro siguiente se muestran los principales datos registrados.

Cuadro 1: Cantidad de ración asignada, edad y peso de los terneros al destete (promedio y desvío), peso a los 151 días y ganancia de peso estimada para los terneros agrupados por rango de peso a fecha fija de destete.

Grupo de peso destete (kg)	45-55	56-65	66-75	76-100	Total
Fecha destete	01-dic-03				
Nº animales	73	201	224	345	843
Ración asignada (kg/ternero)	80	60	50	50	55
Edad al destete promedio (días)	22	43	64	85	64
Desvío (días)	3	4	12	25	32
PV promedio (kg)	46,3	61,1	70,7	85,1	73,6
Desvío (kg)	2,0	2,4	2,5	6,3	15,5
GDP (kg/animal/día)	0,5	0,6	0,65	0,75	0.67
PV al 30-4-04 (151 días) (kg)	122	152	169	198	174
edad de los terneros al 30-04-04 (días)	152	194	215	236	213

Las GDP logradas permitieron llegar a la fecha de destete tradicional (30 de abril) con pesos similares a los que habrían alcanzado de haber permanecido al pié de las madres. Es posible realizar destete precoz a animales con PV (46 kg) y edad (22 días) muy inferiores a las recomendadas. El uso de raciones que atiendan los requerimientos de esta categoría tan sensible a la alimentación, permite desarrollar a los terneros aún en campo natural para poder aplicar el destete precoz en forma estructural a todo el rodeo, sin restricciones en las condiciones.

Palabras clave: destete precoz, ganancia de peso, edad al destete, peso al destete.

Key words: early weaning, weight gain, age of weaning, weight at weaning.