

EL DESTETE PRECOZ

Dr. Carlos Robson*. 2008. INTA, EEA Mercedes, Corrientes.

*Grupo Producción Animal.

www.produccion-animal.com.ar

Volver a: [Destete](#)

// El destete precoz

El destete es la interrupción de la lactancia por separación física del par vaca-ternero. En este momento, se rompe el vínculo entre madre e hijo y éste comienza su vida completamente independiente.

Tipos de destete

Clasificación según la edad que posea el ternero al momento del destete.

Destete	Edad	Peso (kg)
Normal	5 - 7 meses	140 - 180
Precoz	60 días	No menos de 70
super precoz	30 - 35 días	No menos de 40



El destete precoz se efectúa cuando el ternero tiene entre 60 y 90 días de edad o más de 70 kg de peso vivo. Tiene como objetivo incrementar la eficiencia reproductiva de las vacas en muy pobre estado corporal.

El Estado Corporal de las Vacas y el Destete Precoz

El estado corporal o condición corporal de las vacas al momento de iniciar el servicio se encuentra estrechamente relacionado con el desempeño reproductivo. Vacas en pobre estado corporal no logran buenos porcentajes de preñez. En estos casos se utiliza el destete precoz como una herramienta para mejorar el estado de reservas corporales de la vaca. Esto se explica por el hecho de que al suprimir el amamantamiento la energía que la madre utilizaba para producir leche podrá destinarse a recuperar reservas corporales y lograr una nueva preñez.

El ternero

La leche como componente de la dieta sólo es importante en los primeros dos meses de vida, ya que desde este momento las necesidades del ternero son cubiertas por la leche materna cada vez en menor proporción, debiendo este completarlas con su alimentación a base de pastoreo.

Técnica del Destete Precoz

Luego de la clasificación de los terneros, aquellos que recibirán el destete precoz pasarán a un corral diseñado para este fin. El corral contará con bebederos y comederos adecuados según la cantidad de terneros.

La Alimentación

El alimento, ya sea un balanceado comercial o preparado por nosotros mismos, deberá contener 18% de proteína bruta. Este será suministrado junto con heno de buena calidad (alfalfa).

El periodo de corral dura 10 días, luego se lo traslada al campo o a los sistemas de engorde a corral.



[Volver a: Destete](#)