

DESTETE PRECOZ – PROCEDIMIENTOS PRÁCTICOS

Ing. Agr. Gabriela Garcilazo, Ing. Agr. Raúl Barbarossa - EEA Valle Inferior del Río Negro
Med. Vet. Daniel Bolla - AER Río Colorado
Med. Vet. Carlos Speciale – PGB Provincia de Río Negro
Med. Vet. Patricia Alvarado – Universidad Nacional de Centro
mgarcilazo@correo.inta.gov.ar

El destete precoz es una práctica muy útil en años de sequía donde es necesario recuperar el estado de las vacas. Para su correcta aplicación y la obtención de buenos resultados, deben conocerse sus formas de uso y sus limitaciones.

El destete precoz produce un fuerte impacto sobre la vaca:

- ✓ Logra el acortamiento del período parto-concepción, de esta manera mejora la fertilidad del rodeo.
- ✓ Favorece la recuperación de la condición corporal.
- ✓ En años con buena disponibilidad forrajera permite el aumento de la carga animal.

La nutrición y/o el manejo de la alimentación serán diferentes si destetamos a los 30 días (destete hiperprecoz), entre los 60 y 90 días (destete precoz) o de los 90 a 150 días (destete anticipado).

Destete hiperprecoz

Se realiza a los 30 días de vida ante una situación de muy mala condición corporal de la madre. A esta edad, los alimentos ofrecidos deben ser de fácil digestión y densos en nutrientes. Por las características que debe presentar la ración se sugiere utilizar alimentos preiniciadores especialmente desarrollados para esta etapa.

Destete precoz

Se realiza entre los 60 y 90 días de edad (55 a 80 kg de peso) ante una situación de vacas que no están recuperando peso, de condición corporal baja o como estrategia para vaquillonas de primera parición.

La ración en esta etapa puede ser elaborada en el campo a base de maíz y alimentos que aporten proteína (pellet de girasol y soja). Es indispensable una premezcla especialmente formulada para balancear los aportes de minerales y vitaminas. Otra opción es el uso de balanceados comerciales de calidad.

La ración de destete precoz se ofrece durante 30 a 40 días. Posteriormente, teniendo en cuenta la disponibilidad y calidad del pasto, se continuará con una suplementación en pastoreo (utilizando la misma ración en menor cantidad 1% pv) hasta alcanzar los 110 a 120 kg de peso o los 3,5 a 4 meses de edad.

Destetes después de los 90 días (anticipado)

Se realiza cuando la vaca llegó en buen estado al servicio pero las condiciones de pasto no están dadas para que la madre produzca buena cantidad de leche sin poner en riesgo la preñez lograda. Por lo tanto se sugiere inicialmente una ración semejante a la del destete precoz pero durante un período de 20 días y luego dependiendo de la calidad del forraje continuar solamente con forraje o complementar con una ración concentrada.

Manejo del ternero y programa de alimentación:

Es necesario programar con la suficiente anticipación dónde van a ir las madres y dónde los terneros. Las madres no deben oír el balido de los terneros ya que de lo contrario podrían atropellar alambrados y dificultar el éxito de la técnica.

Recomendaciones para la alimentación en terneros de destete precoz:

- ✓ Armar lotes parejos en peso y edad.
- ✓ Es conveniente realizar un acostumbramiento al alimento. Por ejemplo en terneros de 60 kg se comienza con 250 gr. por día y se duplica la cantidad cada 2 días hasta llegar en unos 8 días a la cantidad total que comerán (aprox. el 3% de su peso).
- ✓ Solo durante los primeros 2 o 3 días se puede suministrar, dentro del comedero, poca cantidad de rollo (en lo posible picado) de buena calidad para favorecer el consumo.
- ✓ Los terneros no deben hambrearse, cada día debe observarse el comedero y aumentar la cantidad de alimento si consumieron todo lo entregado el día anterior.
- ✓ Una vez que consumen correctamente el alimento NO debe entregárseles mas rollo.
- ✓ En dietas con maíz, pellet de soja y girasol NO es necesario dar heno en ningún momento.
- ✓ La ración puede entregarse una vez al día y siempre en el mismo horario.
- ✓ Aprovechar ese momento para observarlos y detectar a los terneros que no comen, que estén hinchados o con diarrea.

Características de los corrales:

- ✓ Superficie de unos 7 m² por ternero.
- ✓ Suficiente espacio de comederos, a razón de 0,20 metros lineales por ternero. Pueden ser de madera de álamo, tambores cortados, etc. Cuidar que la altura llegue al pecho del ternero; si se colocan en el piso colocar una maroma sobre el mismo para que no se metan adentro.
- ✓ Ubicar los comederos en forma perpendicular al alambrado.
- ✓ El corral puede construirse con 4 hilos de alambrado eléctrico separados de manera tal que el inferior quede a 30 cm. y el superior a 100 cm. del piso.
- ✓ El piso debe estar consolidado y nivelado para evitar la formación de charcos.
- ✓ Recordar que no deben estar con pasto accesible ni siquiera a través del alambrado.
- ✓ Deben disponer de agua limpia y de buena calidad (bajo contenido de sales) en todo momento.
- ✓ Es indispensable la sombra.
- ✓ Prever un corral vacío porque aquellos terneros que al 3º día no comen deberán ser trasladados a otro corral.

Manejo sanitario:

Es necesario planificar un calendario sanitario teniendo en cuenta:

- ✓ Edad: no es lo mismo animales de 30 que 90 días. Es importante que haya ingerido, en las primeras 12-24 hs de vida, como mínimo 2 litros de calostro, de manera tal de lograr buena cobertura inmunitaria hasta los 90 días de vida.
- ✓ Estado de los animales: los terneros cola tienen en general una menor condición corporal y en consecuencia menor respuesta inmunitaria a las vacunas.
- ✓ Ambiente: el destete provoca stress en los terneros, esto desmejora la respuesta a las vacunas. Pensar en acostumbramiento al manejo diario y al alambrado eléctrico del lote a destetar.
- ✓ Alimentación: La sanidad no solo depende de las vacunas aplicadas sino también de trastornos digestivos y metabólicos consecuencia de una errónea etapa de acostumbramiento.

Recomendaciones:

- ✓ Prevenir la Queratoconjuntivitis y las enfermedades respiratorias (IBR, DVB, neumonía) aplicando dos dosis con diferencia de 21 días.
- ✓ Vacunar siempre al destete contra el Carbunco Sintomático (mancha).
- ✓ Tener presente antecedentes de Carbunco Bacteriano (ántrax), si los hubiera aplicar una dosis al destete.
- ✓ Tratar los animales con un antiparasitario externo, en caso de ser inyectable también cubrimos parásitos internos. De todas maneras no descuidarse y hacer controles coproparasitológicos.
- ✓ Diarreas: Los hacinamientos pueden originar diarreas: infecciosas (Salmonelosis, etc.), parasitarias (gastrointestinales, coccidiosis), digestivas y metabólicas (acidosis).
- ✓ Intoxicaciones: Por ingesta de plantas tóxicas (en los rollos), distribución incorrecta de aditivos (ionóforos) (no es recomendable utilizar urea en esta categoría) e intoxicaciones hídricas (exceso de sal).

Ante la observación de síntomas como diarreas, tos, mucosidades nasales, hinchazones, consulte a un profesional Veterinario. Recuerde que los animales en corrales pueden transmitir rápidamente cualquier enfermedad y es preciso actuar a tiempo.