

MANEJO DE BÚFALOS: LAS REGLAS DE ORO

Marcos Rodríguez da Cunha. 2004. A.A.C.B., Boletín N° 9.

www.produccion-animal.com.ar

[Volver a: Producción de búfalos](#)

Las diez primeras son las reglas de Marcos Rodríguez da Cunha (Andradina-San Pablo), un maestro de la bubalinocultura y las otras cuatro son agregadas por experiencia argentina.

La siguiente es una breve reseña de los cuidados mínimos necesarios para la cría extensiva de búfalos:

1. **Encierre:** encierre nocturno al llegar los animales, durante un mes.
2. **Mano de Obra:** peones que gusten del búfalo.
3. **Separación de lotes:** al tener que separar un lote de búfalos adultos, separarlo potrero de por medio porque tienen tendencia a juntarse.
4. **Desparasitación:** desparasitar los terneros desde el 7mo día. Realizar 3 aplicaciones cada 20 o 30 días.
5. **Destete:** separar, encerrar 5 días en corral y llevar lejos de la madre.
6. **Control de toros:** entran a servicio con 2 años de edad y se los cambia de los 6 años para arriba, a los 7 años las peleas pueden ser mortales.
7. **Pulverización contra piojo.**
8. **Amanse en terneros:** se hace hasta los 2 meses de edad y quedan dóciles de por vida.
9. **Control de carga:** no sobrepastorear, dejar el lote en el mismo potrero durante el año entero con un corral para su manejo. Cuando se maximiza la curva forrajera se controla la oferta colocando bovinos.
10. **Establecer un puesto,** con un peón y su familia para cada 200 animales. Esa familia debe estar en ese lugar, en ese potrero, con esos animales.
11. **Porcentaje de toros:** desde el 2 % en potreros chicos, un plantel de cabaña o en tambos, hasta el 10 % en campos grandes, bajos inundables, abiertos, en los que cada búfalo cuida 20 hembras con tremendo instinto gregario. El búfalo tiene menos libido que el toro vacuno y busca menos a la hembra pero sí mantiene a su grupo unido.
12. **La carga ganadera bubalina** en el invierno a campo natural es crucial: no se van los terneros destetados, como en el caso de los vacunos. Quedan todas las categorías y puede ser un cuello de botella para el sistema de producción.
13. **La búfala de 1ª parición y segundo servicio** esta lactando, gestando y cambiando de dientes en el invierno. Es una categoría a atender.
14. **Es menos selectivo que el vacuno:** no hambrearlos durante el invierno, porque pueden llegar a buscar cualquier verde, inclusive dejando de lado el rechazo por plantas tóxicas.

[Volver a: Producción de búfalos](#)