

CRIANZA DE TERNEROS

Proyecto Lechero. 2007. INTA Centro Regional Santa Fe. Hoja Informativa para Productores.

www.produccion-animal.com.ar

Volver a: [Cría artificial de terneros](#)

INTRODUCCIÓN

La crianza comienza antes del parto, en el secado y el preparto.

El secado debe realizarse 60 a 45 días previos al parto. Esto permite que la vaca se recupere para producir calostro de buena calidad y destinar sus reservas al feto.

En este momento se debe:

- ◆ Vacunar a la vaca para aumentar la inmunidad materna que será transmitida al ternero por medio del calostro (a los 60 y 30 días antes del parto)
- ◆ Controlar la presencia de mastitis clínicas para realizar el tratamiento correspondiente.
- ◆ Controlar la alimentación y el ambiente.

El preparto comprende los últimos 30 días de gestación. En este período se recomienda trasladar a las vacas a un potrero cercano a la vivienda del tambero para facilitar la observación diaria.

ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO

Las primeras horas de vida del ternero son fundamentales y hay maniobras que no debemos descuidar.

- ◆ **Desinfección del ombligo.** Se realiza con yodo, tratando de mojar todo el cordón que todavía está húmedo e introduciendo una buena cantidad dentro del mismo con una jeringa . El yodo, además de desinfectar, actúa como un secante de los tejidos.
- ◆ **Buen calostrado del ternero.** Antes de las 12 horas de vida, que es el tiempo que tiene el ternero para absorber las inmunoglobulinas de la madre y el calostro de mejor calidad. Se deberá contar con un banco de calostro por si la vaca no puede alimentar al ternero. El consumo de calostro debe ser el 10 % del peso vivo aproximadamente
- ◆ **Control de la temperatura ambiente** por medio de reparos, principalmente en la primera semana de vida.



RUTINA DE CRIANZA

Para realizar una correcta rutina de crianza se deben respetar algunos requisitos:

- ◆ Suministrar la leche a temperatura corporal (38°) , respetando horarios y recorrido.
- ◆ Brindar agua fresca siempre dos horas después de cada toma de leche
- ◆ Controlar la cantidad de alimento que se les da.
- ◆ Separar a los animales enfermos.

OTRAS RECOMENDACIONES DE MANEJO

Para disminuir la aparición de enfermedades y que la mortandad de terneros no supere el 5 %, es necesario tomar algunas medidas:

- ◆ Separar el ternero de la madre entre las 24 y las 48 horas de nacido para evitar problemas de aplastamiento o transmisión de enfermedades de otras vacas.
- ◆ Brindar sombra en los meses de verano y reparo en invierno.
- ◆ Limpiar todos los días los baldes y demás utensilios.
- ◆ Controlar el estado sanitario de los terneros cada vez que se los alimenta (al menos dos veces por día) para realizar un rápido diagnóstico.
- ◆ Mantener la limpieza y desinfección del calzado y la ropa del operario.
- ◆ Cambiar de lugar las estacas en forma periódica.
- ◆ Aislar a los animales enfermos y alimentarlos siempre al final.
- ◆ Diagramar un plan de vacunación acorde a los antecedentes de enfermedades de cada establecimiento.
- ◆ Confeccionar registros individuales de tratamientos realizados para tener una definición precisa de los problemas de salud, aciertos y desaciertos en las medidas de manejo y poder tomar decisiones administrativas.



Volver a: [Cría artificial de terneros](#)