

Volver a: [Producción Caprina](#)

LA PARICIÓN

INTRODUCCIÓN

Todos los chivateros conocen perfectamente bien cuáles son los signos exteriores que presentan las cabras previo al parto, incluso muchos de ellos conocen casi con exactitud la fecha de parición.

De cualquier forma, conviene que los repasemos brevemente:

- ◆ En el último mes de gestación la ubre crece y se llena de leche.
- ◆ Se observa un hundimiento a ambos lados de la cola.
- ◆ Aparece una descarga de líquido por la vulva.

EL DÍA DEL PARTO


- ◆ La cabra bala insistentemente.
- ◆ Se echa y se levanta varias veces.
- ◆ Está inquieta y patea el suelo.
- ◆ Aparece la bolsa de agua.

Es importante que el parto ocurra en el corral, para intervenir en caso de dificultades y atender tanto al cabrito como a la madre.

Esto lo sabe el productor, que deja encerradas a las parturientas, el día anterior, en el corral.

COMO ATENDER A LA CABRA EN EL PARTO


- ◆ Colóquela en una cama de paja seca protegida del frío y la lluvia.
- ◆ Aliméntela y dele agua fresca.
- ◆ No la ayude salvo que el caso sea desesperante.
- ◆ Tenga a mano una caja para poner las crías, un trapo limpio y un frasquito con yodo.



Posiciones normales del parto


Una vez que ha empezado el parto, las crías nacen generalmente en 1 hora o menos. Si pasan más de 2 horas es probable que se deba a que el/los fetos vienen en mala posición.

Posiciones anormales del parto



Los casos muy difíciles trate de resolverlos Usted. Para eso:

- ◆ Lávese las manos con jabón.
- ◆ Introdúzcalas suavemente.
- ◆ Intente reacomodar el feto. En lo posible trate de que adopte la posición normal, con las 2 manitos hacia delante y haga fuerza suavemente para extraerlo.



Una vez que nació, el cordón umbilical se corta solo. Si no ocurre, córtelo Usted y embéballo con yodo. Trate de doblar el corte del cordón hacia el cuerpo del cabrito y manténgalo apretado durante 1 minuto.

DESPUÉS DEL PARTO

- ◆ Deje la cabra tranquila.
- ◆ Ahuyente a los perros.
- ◆ Ofrézcale agua.
- ◆ Observe si larga “las pares” (placenta).

Esto tiene que ocurrir dentro de las 12 horas siguientes. Si no la expulsa, ayude con un trapo limpio para que salgan. Si pasan más de 12 horas con las “pares” adentro, corre el riesgo de una grave infección.

Muchas cabras por vicio o carencias de minerales se comen la placenta ; EVÍTELO!

ABORTO

Si la cabra **abortó**, trátela como si hubiera tenido un parto normal.

Identifíquela. Cuide que largue “las pares” dentro de las 12 horas. Si no lo hace, probablemente tenga BRUCELOSIS.

- ◆ Entierre y cubra con cal viva o queme los “despojos” (aborto).
- ◆ Proceda de la misma forma con la cama.
- ◆ No la haga cubrir hasta que no se haya cortado la descarga de líquido (“sangrasa”) por la vagina.

CUIDADO DE LOS CABRITOS

Inmediatamente después del parto:

- ◆ Seque el moco de la nariz y de la boca.
- ◆ Deje que la madre lo lama para terminar de secarlo y reconocerlo.
- ◆ Si el cabrito está agitado, tómelo de las patas, póngalo boca abajo y golpéele los pulmones.
- ◆ Unte el cordón umbilical con yodo.
- ◆ Trate de que mame pronto. Lo ideal es que sea dentro de los 15 minutos de nacido.
- ◆ La toma de calostro es muy útil, porque le protege de enfermedades y le ayuda a expulsar el meconio.
- ◆ Durante los tres primeros días los cabritos deben tomar leche (calostro) todo el tiempo que quieran.
- ◆ Hasta el mes y medio de edad conviene tenerlos en el chiquero. A partir de los 4 meses, separe los machos de las hembras, si es que no los castró, para evitar preñeces por robo y desgaste prematuro.



Facilitar el amamantamiento de los cabritos es fundamental para el éxito de la empresa.



Lote de cabritos lecharles de parición de otoño, encerrados en el “chiquero”. Los machitos se venden en promedio a los 60 días, alimentándose durante toda esa etapa únicamente con leche.

Volver a: [Producción Caprina](#)