



Año III Nº 12

## Suplementación en ovinos. Parte II

Información suministrada por  
Ing. Agr. Ramón Gambetta

### Alternativas de suplemento:

- Heno/Rollo (alfalfa, pastura, moha, etc.)
- Silo (planta entera, grano, etc.)
- Granos (maíz, sorgo, etc.) **El grano siempre debe ser entero**
- Subproductos (afrechillo, scrap, pellet, etc.)
- Alimento balanceado

### Cuanto dar:

#### Granos (maiz, sorgo, avena, cebada, etc.)

- 200 a 300 gr/animal/día
- Comenzar en forma gradual desde 50 gramos por oveja. Adiestrar un grupo 10 días antes aproximadamente.
- Calcular 15 cm lineales por cabeza.

#### Heno (fardo/rollo)

- 1,5 a 3% del peso vivo por animal por día

#### Silo

- Se calcula igual que heno aproximadamente.

Para un mejor aprovechamiento de los suplementos y que tenga un resultado económico, si es posible consultar un técnico o en las Estaciones Experimentales de INTA. A continuación, se presenta en forma resumida los principales alimentos que se pueden utilizar en suplementación de ovinos, agrupados los de elevado contenido proteico por un lado y los de elevado contenido energético por otro:

GRUPO	NOMBRE	EM (Mcal/KgMS)	% PB
CASCARA	GIRASOL	0.71	3.8
PASTURA	NATURAL	1.39	11.6
ROLLO	MOHA	1.88	9.6
SILAJE	MAIZ	2.13	6.3
VERDEO	SORGO	2.15	14.0
<b>FARDO</b>	<b>ALFALFA</b>	<b>2.15</b>	<b>18.8</b>
<b>EXPELLER</b>	<b>GIRASOL</b>	<b>2.16</b>	<b>36.0</b>
<b>VERDEO</b>	<b>RAIGRAS</b>	<b>2.25</b>	<b>18.0</b>
SILAJE	SORGO	2.30	6.4
<b>PASTURA</b>	<b>ALFALFA</b>	<b>2.40</b>	<b>16.8</b>
GRANO	AVENA	2.48	11.5
VERDEO	MOHA	2.51	11.2
VERDEO	SOJA	2.52	16.6
<b>PELLET</b>	<b>GIRASOL</b>	<b>2.52</b>	<b>32.0</b>
AFRECHILLO	TRIGO	2.54	17.6
VERDEO	AVENA	2.60	22.0

Para suplementación en el servicio


Para suplementación en el servicio

Para suplementación en el servicio

Alto contenido energético (gestación)			
GRANO	SORGO	2.80	8.3
VERDEO	AVENA	2.84	23.2
EXPELLER	SOJA	2.88	45.2
SILAJE	SORGO GRANO	2.94	8.4
SILAJE	MAIZ GRANO	3.03	8.8
GRANO	MAIZ	3.25	9.8
PELLET	SOJA	3.27	45.4

En las gráficas siguientes se aprecia los momentos de suplementar de acuerdo a la época de servicio. La línea roja indica los requerimientos del vientre y la verde la curva de producción de pasto del campo natural en Entre Ríos

### Cuando Suplementar




#### Encarnerada de verano:

Falta forraje bueno en diciembre – febrero poca fertilidad, (puede necesitar alguna suplementación)

Partición en el invierno: falta leche, muertes de corderos al nacer.

Necesidad de suplementación de por lo menos 60 días

### Cuando suplementar



#### Encarnerada otoño:

Rebrote de pasturas: buena fertilidad (no necesita suplementar)

Partición: a partir 15 de agosto

De ser necesario solo se suplementa fines de julio

Lic. Marta Iselli  
 Agosto de 2016  
 Equipo comunicaciones Proyecto Delta  
 Cristian Barreto, Mariana Cabezas, Marta Iselli