

# Algunos aspectos de la producción ovina en Río Negro

Por sus características geográficas, Río Negro tiene una dispersión estacional importante de la producción de corderos, según se desarrolle en la Precordillera, en las Sierras y Mesetas Occidentales, en la Meseta Central, en el Monte o en las áreas de los Valles Medio e Inferior. Esta dispersión está asociada a dos sentidos de variación ambiental: de oeste a este por efecto de la cordillera y el mar y de sur a norte, dado por la presencia de la Meseta de Somoncuro.

## ¿Qué efectos provoca esta variación?

Esta variación ambiental provoca una desestacionalización natural, ya que debido a las diferentes características de estas regiones ecológicas, por precipitaciones y altura sobre el nivel del mar, los servicios se realizan desde el mes de marzo hasta junio y en algunos casos en primavera. Esto trae como ventaja una extensa época de producción, lograda de manera natural, que si se quisiera lograr en otras zonas del país, demandaría esfuerzos tecnológicos importantes, con costos adicionales en muchos casos. Como consecuencia de esto se pueden producir corderos desde el mes de octubre hasta abril-mayo. La aún pequeña pero creciente actividad que se viene desarrollando en el Valle Inferior y zonas aledañas, puede ampliar aún más este período.

## ¿Cuáles son los problemas más importantes?

En general la actividad se desarrolla en un pastizal natural que está amenazado por un proceso de desertificación de importancia y muchos de sus efectos se reflejan en la producción. A esto se suman factores como cargas más elevadas que las que los establecimientos pueden soportar, deficiencias en infraestructura, de manejo y los problemas

  
Ing. Agr. M. Sc. Celso Giraudo  
*cgiraudo@bariloche.inta.gov.ar*  
Area Producción Animal  
INTA EEA Bariloche



Dr. Sebastián Villagra  
*svillagra@bariloche.inta.gov.ar*  
Grupo de Sistemas de Producción,  
Economía y Sociología Rural  
INTA EEA Bariloche

La información que se brinda en este artículo es parte de un extenso trabajo de relevamiento de los factores que afectan la producción ovina en la Provincia de Río Negro, realizado durante tres años consecutivos, en el cual participaron más de treinta establecimientos de toda la provincia. Se realizó en convenio con el Ente para el Desarrollo de la Región Sur y fue cofinanciado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación, por lo tanto la información pertenece a estas instituciones y cuenta con un número importante de colaboradores.

de depredación por zorro colorado y puma según las áreas ecológicas.

De estos aspectos, los que se vinculan a la nutrición de los animales, se reflejan en indicadores como la condición corporal (CC) con que se realizan los servicios y los partos.

### Condición corporal y peso al servicio de diferentes majadas para los años 2004 y 2005





Para obtener un buen servicio es necesario contar con una CC de por lo menos 2,5. Situación semejante sería la del parto. Si bien en los gráficos vemos que la media general, especialmente en el servicio, está en torno a estos valores, hay bastante variación entre establecimientos y entre años. Esto nos lleva a pensar que en algunos casos, las pérdidas de corderos, seguramente pequeñas, pero pérdidas al fin, pueden comenzar en esa etapa. Estos datos ponen en duda lo que se pensaba, que por tener la oveja un largo período de recuperación entre el parto y el servicio las preñeces siempre serían altas.

El peso es sólo en este caso un indicador de que en la Provincia coexisten majadas de diferente tamaño provenientes de un proceso histórico y de aportes de diferentes fuentes genéticas. La CC es el indicador más categórico cuando se pretenden analizar estados nutricionales.

*Para obtener un buen servicio es necesario contar con una condición Corporal de 2,5*

Si se analiza en preparto vemos que también existe una variación semejante.

### Condición corporal y peso al parto años 2004 y 2005



*Cuando el cordero debe valerse por sí mismo en el pastoreo las ganancias de peso decrecen*

La situación del preparto es más compleja, ya que valores bajos de CC en este momento, comprometen el parto. Las ovejas flacas tienen dificultad para establecer el vínculo con sus crías, los corderos nacen livianos, la producción de leche es baja y como consecuencia hay pérdida de las crías o tasas de crecimiento bajas. Esto está vinculado a la carga en los diferentes ambientes por dos razones, en algunos casos, especialmente en el Monte por la baja producción de forraje en los años de poca lluvia, pero en otros se debe a la elevada carga con la que están siendo manejados los campos. Esto se refleja en los porcentajes de señalada y el peso de los corderos al destete o a la señalada.

#### Porcentajes de señalada

Los porcentajes de señalada son bajos y con mucha variación entre años y áreas ecológicas y en general obedecen a problemas nutricionales y de manejo.

En algunas situaciones, especialmente en las Sierras y Mesetas y la Precordillera, la pérdidas se potencian por problemas de depredación, especialmente por zorro colorado y


algunos casos por puma. En el Monte Occidental o "Monte pobre", este problema, según los productores con lo que hemos trabajado, no es relevante, aunque en algunas oportunidades se le atribuye daño al zorro gris o hacen referencia al "zorro pampeano".

También influyen dos variables climáticas que influyen de manera diferente en las distintas áreas. Generalizando, en la Meseta, sin minimizar el efecto de sequía, el factor más importante es el frío y las contingencias climáticas espontáneas, como las nevadas, mientras que en el Monte es la falta de lluvias, especialmente en otoño y primavera.

### El crecimiento de los corderos

El crecimiento de los corderos se lo puede analizar en dos etapas, mientras está influenciado por la lactancia de la madre, hasta la señalada, y cuando esta va perdiendo influencia, entre señalada y destete.

La señalada se realiza en fechas y a edades diferentes según las regiones. Hay señaladas en que los corderos tienen 30 días y hasta de dos meses o más. Esto impide compararlas entre sí, si no se emplean algunos factores de corrección. A modo de ejemplo se presentan las ganancias de peso entre el nacimiento y la señalada de las diferentes majadas analizadas.



Esta ganancia de peso también está influenciada por la edad del cordero a la que se practica la señalada, saliendo favorecidas en esta comparación las más tempranas. A pesar de ello se ve que hay diferencias entre establecimientos y años. Para ello tiene mucha influencia la nutrición de las madres y la de los corderos en pastoreo.

Entre nacimiento y señalada la tasa de crecimiento de los corderos es mayor que entre señalada y destete y responde al estado nutricional de las madres y su influencia sobre la lactancia. Cuando el cordero debe valerse por sí mismo en el pastoreo las ganancias de peso decrecen y en algunos casos son muy bajas.

Si recapitulamos se ve que la variabilidad de la mayoría de los indicadores analizados es una constante, con áreas más inestables como las de Monte, donde se pueden encontrar en algunos años los mejores corderos de la Provincia y en otros, una producción prácticamente nula. Las demás áreas ecológicas desde este punto de vista son más estables y la explicación en buena parte se encuentra cuando se analizan las dietas de los animales.

### ¿Qué tipo de reses se producen?

En el mismo trabajo se realizó un relevamiento de los dos frigoríficos de la región que faenan la mayoría de los corderos de la provincia.

El promedio de 40.000 reses individuales es de 10,9 kg. al gancho. La oferta varía con los años, pero en general se dispone de corderos desde octubre a mayo, siendo los primeros meses los más variables debido a la inestabilidad ya analizada de la producción del área del Monte. La mayor concentración corresponde a los meses de diciembre, enero y febrero.

Debido a la capacidad de almacenaje en frío que se ha desarrollado en la región y algunos sistemas de engorde, la oferta, en menor cantidad, se extiende a los meses del invierno, especialmente en restaurantes.





## ¿Cuál es el panorama futuro?

Parte de la Provincia ha ingresado recientemente a la zona libre de fiebre aftosa, lo que seguramente producirá un cambio en la comercialización de este producto. Mientras tanto se cuenta con un panorama nacional sumamente interesante, ya que provincias competidoras en este mercado como Santa Cruz y de manera creciente Chubut, han optado por comercializar su producción de corderos al mercado de la exportación, especialmente a la Unión Europea. Lo mismo ocurrió con países limítrofes como Uruguay, hoy volcado a la exportación de corderos pesados, y Chile que exporta a Europa. Ambos, durante el modelo económico anterior del 1a1; vendían cantidades importantes en nuestro país.

En el orden provincial es necesario darle mayor estabilidad a la producción, especialmente en el área ecológica del Monte. Este factor de vulnerabilidad que tienen estos sistemas se hizo lamentablemente presente en este ciclo, 2007/2008, en el que se combinaron la sequía con mucho frío, produciendo un duro impacto a la producción ovina en general.

Las variaciones cíclicas del clima periódicamente pondrán en "jaque" a este sistema, ya que por más que se tomen decisiones anticipadas, la mayor complicación será siempre el manejo de una carga relativamente fija frente a una producción forrajera variable. A pesar de ello hay una demostrada variabilidad entre establecimientos, lo que indica que aún en las circunstancias de manejo actuales se pueden atemperar estos impactos, situación que puede mejorar si se logra difundir el conocimiento disponible para mejorar el manejo y facilitarlo mediante inversiones estratégicas.

Salvo las áreas ya señaladas, por las ventajas que hoy tiene Río Negro de contar con la producción basada en la raza Merino, debido al buen precio de las lanas finas, la provincia será por muchos años productora de corderos livianos. Sin embargo para alcanzar una producción estable de carne los sistemas deberán ir modificando la infraestructura y su manejo. Resultan claramente distintas las necesidades para producir lana que para producir lana y carne. De no realizarse estas reformas el sistema seguirá faltando cada tanto a la cita del mercado por no tener producto y de esa forma es muy difícil poder aprovechar todas su bondades. ■