

EVALUACIÓN DE LA PERFORMANCE REPRODUCTIVA DE UNA MAJADA

Méd. Vet. Jorge Manazza. 2003. E.E.A. INTA Balcarce.

www.produccion-animal.com.ar

Volver a: [Producción Ovina](#)

La performance reproductiva en las ovejas es posible realizarla al momento de la señalada. En majadas con servicio de otoño, octubre es un buen mes para evaluar el comportamiento reproductivo y clasificar a la majada en tres categorías:

- 1) Oveja con cordero al pie
- 2) Oveja que perdió el cordero
- 3) Oveja seca

En establecimientos con servicio muy prolongado puede presentarse una cuarta clasificación:

- 4) Oveja preñada

Determinamos el estado de las ovejas mediante la palpación o examen de la ubre, los pezones y observando también la secreción de la misma.

CRITERIOS PARA REALIZAR LA CLASIFICACIÓN

Ubre, pezones y tipo de secreción

Oveja lactando:

Ubre bien desarrollada, turgente y elástica; constricción intermamaria bien definida; pezones largos, suaves y “limpios” hasta la base. Secreción láctea de caracteres normales.

Oveja que perdió el cordero:

La ubre puede estar algo desarrollada, presentar tamaño variable; desde inflada por la acumulación láctea, hasta poco desarrollada y de consistencia firme. Constricción intermamaria definida. Pezones desarrollados, duros y “sucios” que la diferencian fácilmente de la que tiene cordero al pie.

Las ovejas con ubres muy cargadas deben ordeñarse para evitar la presentación de mastitis. La secreción varía de acuerdo al tiempo transcurrido en que perdió el cordero; si la pérdida fue reciente (10 a 15 días), la secreción puede ser láctea, de consistencia cremosa. Si la pérdida fue anterior, es diluida y de color blanco transparente.

Este tipo de secreción difiere de la láctea normal por la viscosidad y la presencia de grumos.

Oveja seca:

Ubre no desarrollada. Pezones secos y sucios. Un desarrollo infantil de la ubre y los pezones, indica que no ha parido nunca. La secreción es de color miel, pajizo o ámbar, a veces nula.

METODOLOGÍA DE LAS DETERMINACIONES

Desarrollo de la ubre:

NULO – MEDIANO – GRANDE

Constricción intermamaria:

INDEFINIDA – DEFINIDA

Pezones:

LIMPIOS – SUCIOS

CHICOS-MEDIANOS-GRANDES-ANORMALES

Tipo de secreción:

LÁCTEA – LÁCTEA ALTERADA – TRANSPARENTE O NULA

Características secundarias a tener en cuenta

Las ovejas “secas” generalmente presentan un mejor estado de gordura, (buena condición corporal) contrariamente a las que tienen en el cordero al pie. En un estado intermedio se observan generalmente las que han perdido al cordero.

Las “secas” rara vez presentan vellones débiles, por el contrario, de excelente calidad y carácter; con una lana de barriga densa y larga.

Las “paridas” se presentan normalmente en un estado bueno a delgado o regular, según la alimentación que hayan recibido y los corderos que tengan al pie. Frecuentemente presentan vellones débiles y algunas veces quebradizos, especialmente en el caso de criar mellizos. Suelen observarse poco calzadas y con lana de barriga rala y apelmazada.

MÉTODO O RUTINA PARA CLASIFICACIÓN

Disponiendo de una manga el trabajo es muy rápido. Una persona con experiencia y dos buenos ayudantes, clasifica unas 100 a 150 ovejas por hora. Se trabaja con mayor comodidad si hacemos una fosa de aproximadamente 1,20 m de profundidad al final de la manga y al costado de la puerta de aparte, para que el operador se instale en ella de pie y pueda determinar rápidamente el estado de la ubre, debemos eliminar una de las tablas inferiores de la manga.

Se determina rápidamente, por el desarrollo de la ubre, su forma, tamaño y limpieza de los pezones, si la oveja es parida o seca (a veces las paridas presentan restos de sangre coagulada en los genitales y ubre). Luego, en base al tipo de secreción, estado, etc., se determina si está lactando o ha perdido al cordero. Inclusive puede determinarse la fecha aproximada en que lo perdió.

El ayudante que opera la puerta de aparte, puede determinar el estado de la dentadura, si es necesario tizar las ovejas que serán refugadas al destete.

Mediante estas evaluaciones es difícil que se presenten casos de duda, el margen de error es mínimo (alrededor del 1%), lo que hace que esta técnica sea muy practicada y eficiente.

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES

Características	Estado de la oveja		
	Cordero al pie	Perdió el cordero	Seca
Desarrollo de la ubre	Grande	Grande a mediano	Sin desarrollo
Tamaño de los pezones	Grandes	Grande a mediano	Chicos
Limpieza de los pezones	Limpios	Sucios	Sucios
Tipo de secreción	Láctea	Láctea de consistencia cremosa a diluida con grumos	Líquida de color miel, pajizo o ámbar. A veces nula
Estado	Regular a delgada	Bueno a regular	Muy gorda
Lana de barriga	Rala y apelmazada	Apelmazada	Densa y larga
Calce del vellón	Poco calce	Poco calce	Muy calzada
Sanidad del vellón	Regular a débil	Buena	Excelente

Volver a: [Producción Ovina](#)