

# LA OVEJA EN LA ARGENTINA

Volante Filatélico N° 1143\*. 2013. Información Veterinaria (CMVPC), Córdoba, Boletín 175:41-42.

\*Correo Argentino, agosto de 2009.

[www.produccion-animal.com.ar](http://www.produccion-animal.com.ar)

Volver a: [Razas ovinas](#)

## INTRODUCCIÓN

En 1549, el conquistador Ñuflo de Chaves, que había desembarcado ocho años antes en la isla de Santa Catalina con la partida de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, regresó a Asunción desde el Perú trayendo las primeras ovejas al Virreinato, muy probablemente ejemplares rústicos de las razas Siria, Berberisca y Pirenaica. Más fáciles de desplazar por territorios accidentados y menos exigentes en cuanto al pastoreo y al requerimiento de agua que los vacunos, las ovejas satisfacían óptimamente la provisión de carne; los indígenas, por lo demás, bastaban para asegurar las tareas de cuidado y esquila. De tal modo, en el litoral y el norte del territorio se impusieron sobre las vacas que, a la inversa, predominaron en la región pampeana.

Hacia 1810, había en el país unos 3 millones de ovinos de baja calidad, de las razas Criolla y Pampa. Tras la independencia, levantadas las trabas que la Corona imponía para el desarrollo lanar fuera de la Península, llegaron -en 1813- las primeras 100 ovejas Merino -y sus respectivos carneros-. El gobierno de Rivadavia importó de Sajonia otros cien ejemplares y 30 Southdown en 1824 y 150 Merino más, dos años después. Entre 1836 y 1838 ingresaron 7.850 cabezas.

A mediados del siglo XIX, la industria europea comenzó a requerir lana larga, por lo cual la explotación lanera cobró un súbito auge: por más de cuarenta años fue la primera exportación de la Argentina. Una verdadera "fiebre lanar" terminó por desplazar las haciendas bovinas a campos marginales, tan formidable era la renta de su explotación. En las dos primeras décadas del siglo siguiente, las vacas recuperaron terreno en la pampa. La cría del ganado lanar se desplazó hacia el sur: en 1930 la Patagonia, que hacia 1888 apenas si contaba con 300 mil cabezas, albergaba 16 millones de ejemplares. Los próximos trece años serían los de mayor volumen de producción: para 1943, con una producción de 234.900 toneladas de lanas sucias, la Argentina ocupó el tercer lugar mundial como productor; exportador. Al contrario, la segunda mitad del siglo significó un declive -debido a causas tanto externas (precios) como internas (políticas impositivas)- que sólo recientemente ha comenzado a revertirse.

## DISTRIBUCIÓN


En la Patagonia -sobre todo; en la región centro y sudeste de Chubut, en Río Negro y la casi totalidad de Santa Cruz: unos 300.000 km<sup>2</sup>- se concentra más del 60 por ciento del rebaño nacional, unos 12,5 millones de cabezas. Casi la totalidad corresponde a las razas Merino (para lana) o Corriedale (lana y carne); además, en la zona de transición se crían razas sintéticas, como la Corino y la Cormo (lana y carne). También existen tambos con ejemplares de Frísona o Pampinta, y algunas majadas de Hampshire Down, Suffolk, Texel y Border Leicester. En la Pampa Húmeda -45.000 km<sup>2</sup> que comprenden Buenos Aires y partes de La Pampa, Córdoba y Santa Fe-, la mayor concentración lanar se registra en el sur de la provincia de Buenos Aires: casi un millón y medio de cabezas. Predominan las razas Lincoln, Romney Marsh y Corriedale, todas ellas aprovechadas doblemente para producir tanto lana como corderos o capones para consumo de estancia. En la Mesopotamia -en los alrededores de 56.000 km<sup>2</sup> que se reparten el norte de Entre Ríos y el sur de Corrientes- se estima en un millón la cantidad de ovinos, sobre todo de las razas Corriedale, Romney Marsh e Ideal. Las lanas se caracterizan por su alta resistencia.

En la explotación minifundista del norte, noroeste y centro oeste del país, la explotación lanar -mucho más escasa- es un recurso complementario de la explotación caprina.

## RAZAS

Una raza es una definición categórica de individuos de una especie (o subespecie) en función de uno o más caracteres morfológicos o funcionales secundarios, que corresponden a rasgos de la estructura ósea, de pigmentación, de musculatura, del pelaje, de las orejas, etcétera.

Los sellos de esta emisión filatélica corresponden a las seis razas más representativas de la explotación ovina en el país.



## Merino

Raza lanera por excelencia. La cabeza es ancha, convexa y proporcionada al cuerpo; orejas vigorosas y sin lana, bocha ancha y hocico huesudo, fuerte y largo, con arrugas pronunciadas en la parte superior; los machos tienen cuernos espiralados, grandes y fuertes, de color ámbar claro, y las hembras son mochas. Pescuezo largo, huesudo, musculoso y erguido. Cuerpo armonioso, lomo recto y largo, buen arqueado y profundidad de costilla; grupa redondeada y proporcionada al tronco. Extremidades separadas, paralelas y sin inclinaciones; pezuñas blancas y con buena posición, de hueso fuerte y aplomadas. La lana es blanca; el vellón es denso, uniforme, suave y brillante, de buen rizado profundo y buen largo de mecha.

## Romney Marsh

Raza de doble propósito. Cabeza mocha, de tamaño algo pequeño, chata entre las orejas, que son carnosas, redondeadas y cubiertas de pelo fino o lanilla; ojos prominentes y hocico con ollares separados, amplios y abiertos, bien negros. Cuello fuerte y relativamente largo; lomo ancho, recto y largo, de gran valor comercial, como toda su carne. Los cuartos son largos y carnosos; las extremidades -medianas, con garrones anchos y bien separados- rematan en pezuñas fuertes de color negro. El vellón es pesado y uniforme, de mecha cilíndrica, buena longitud y libre de pelos; la lana que produce (hasta más de 5 kg por animal) es de excelente calidad industrial.

## Corriedale

Productor de doble propósito, brinda carne y lana de excelente calidad. Su rusticidad permite que se lo críe desde el sur de Brasil hasta la Patagonia. En América del Sur se concentra el mayor stock mundial. La cabeza es fuerte, aunque no desarrollada en exceso; hocico ancho y compacto y ollares (entradas de la cavidad nasal) y conjuntivas negros. La cara, libre de lana, está cubierta por pelos blancos, densos y suaves sobre el frente del hocico y alrededor de los ojos; orejas medianas, carnosas y suaves, con la abertura auricular hacia delante y desprovistas de

lana. Ambos sexos son mochos. Cuello fuerte y ancho y cuerpo amplio y robusto; patas medianas, con pezuñas de color negro. El vellón es blanco, cerrado y de calce bajo.

### **Hampshire Down**

Es una raza carnicera, de cuerpo cilíndrico, macizo y alargado. La cabeza es destacada, las orejas están dispuestas horizontalmente y bien separadas; el morro u hocico es ancho y chato; no presenta cuernos. Debido a la pigmentación oscura en la cabeza y las orejas, también se conoce a la raza como "cara negra". El cuello es fuerte y musculoso; el costillar, arqueado; el lomo, ancho, recto, cubierto de músculos y paralelo a la línea baja del vientre. Las patas son fuertes, de garrón corto, bien aplomadas y con cuartos traseros redondeados, donde se aprecia su cualidad carnicera. Tanto las patas como las pezuñas presentan un color pardo oscuro. El vellón es cerrado y la lana es blanca.

### **Lincoln**

Raza doble propósito. De gran desarrollo corporal, fuerte y compacto, tiene las formas redondeadas y la envergadura ancha típica de las razas carniceras. Su cabeza es chata entre las orejas; desde el testuz, un copete de lana cae sobre la cara. Tiene orejas medianas, suaves, cubiertas de lana o pelos; ojos separados, nariz ancha -libre de lana y con ollares abiertos y negros-. La cara está cubierta de pelos blancos, cortos y sedosos. El cuello es medianamente corto fuerte. El cuerpo, cilíndrico, es largo profundo; tórax ancho, cruz y dorso largos y alineados con el lomo. Las extremidades tienden a ser largas, fuertes y aplomadas; pezuñas negras. El vellón es de tipo llovido y muy extenso

### **Frisona**

Raza muy dócil, de explotación eminente lechera, tiene también aptitudes carniceras y, en mucho menor medida, laneras. Cara, parte de las patas y cola libre de lana (en general blanca, excepto en una variedad negra), carece de cuernos. Su ubre (rosada y con dos pezones de ubicación lateral, orientados hacia abajo) debe ser de inserción amplia, con una buena masa glandular, suficiente tejido conectivo y abundante irrigación sanguínea. Produce cerca de 3 litros por día, con 6% de grasa y 5% de proteínas (el rendimiento quesero duplica al de la leche de vaca; también se utiliza para ricota, yogurt, dulce de leche y helados), y hubo casos que superaron los 1.000 litros de leche por lactancia.

Volver a: [Razas ovinas](#)