

¿Cuándo deberíamos liberar a servicio a una cachorra?

Fuente: Victor Atilio Parodi, Médico Veterinario, Santa Fe- Argentina. Artículo extraído de www.engormix.com

La alimentación de la cachorra es de suma importancia en la vida productiva y reproductiva de ésta, cuando se alimenta incorrectamente algunas cachorras llegan a edades muy tempranas al peso de servicio, pero éstas no se hallan maduras sexualmente, y cometeríamos un grave error, al darle servicios.

También no podríamos cumplir con el plan vacunal, que se le realiza a las primíparas donde se la empieza a vacunar a partir de los 6 o 6, 5 meses de vida con intervalos de 15 días para repetir la segunda vacunación y la tercera como refuerzos.



Recordemos siempre: que una cachorra servida a edad temprana no está preparada para llevar adelante un parto, con una cantidad elevada de lechones, ya que su útero es corto.

Por ejemplo: el útero de una cachorra de 6 meses mide 30 a 40 centímetros de largo. Por lo tanto parirá entre 4 y 6 lechones. Si dejamos pasar un celo a los 201 días el útero medirá entre 60 y 70 centímetros y si dejamos pasar otro celo mas, llegaríamos a los 221 días, con útero de 120 a 130 centímetro. Por lo tanto me aseguraría de esa manera tener mayor cantidad de lechones, tener una mejor cerda preparada para una lactancia y no quedaría tan retrasada (delgada) para el próximo servicio.

Con esto quiero decirles que tenemos que tener en cuenta 2 puntos fundamentales para dar servicio:

- 1) la edad
- 2) el peso del animal.

La edad óptima para dar servicio a una cachorra es de 7 meses y medio.

El peso tendría que estar entre los 120 y 130 kilos.

Su ganancia de peso desde que la servimos hasta el momento del parto debe ser superior a los 60 kilos para llegar al mismo de la mejor manera.-

Una cerda primípara preñada tiene que alimentarse correctamente para seguir

creciendo, ganando los kilos anteriormente mencionados.

- para llevar adelante una buena gestación,
- para parir lechones viables de buen peso al nacimiento.(1,400 kg promedio.)
- para poder amamantar la mayor cantidad de lechones.
- para quedar en buen estado corporal luego del destete.

Para que pueda ser servida nuevamente en un lapso de tiempo que va de 3 a 7 días post destete.

Si fallamos en ésto arruinaremos la vida reproductiva de la cerda y tendrá menos vida útil en nuestra granja.