

# CUANDO ROTAR LOS ANIMALES SOBRE UNA PASTURA

The stockman farmer. 2001. Hereford, Bs.As., 65(625-626):87.

[www.produccion-animal.com.ar](http://www.produccion-animal.com.ar)

Volver a: [Sistemas de pastoreo](#)

El tiempo oportuno para rotar las pasturas depende de muchos factores. Se deben tener en cuenta las siguientes seis observaciones que ayuden a tomar tal decisión:

**1) Mirar para abajo:** ¿Se ha utilizado la parcela presente como se deseaba o todavía queda mucho forraje? En general, los novatos en el pastoreo tienden a sobrepastorear la pastura; deje un poco más de forraje del que cree necesario.

**2) Mire alrededor:** ¿La parcela que sigue, está lista para ser pastoreada?. ¿Cuán rápido es el nivel de crecimiento de la pastura?. Un crecimiento rápido, puede indicar la necesidad de acelerar la rotación o de cosechar algunas parcelas realizando rollos. El crecimiento lento indica que hay que alivianar la carga animal, agregando hectáreas o dando heno.

**3) Mire a los animales:** ¿Parecen hambrientos y están en mal estado?. El ganado puede hacerle saber al productor cuando necesita que lo cambie, pero el deseo de moverse puede ser muy temprano para una correcta utilización. A los animales que se le exige alto rendimiento, deben moverse más seguido.

**4) Mire atrás:** ¿Con qué rapidez está rebrotando la parcela?. Los periodos de crecimiento lento pueden indicar la necesidad de hacer la rotación más lenta; por lo tanto, reduzca la carga animal (agregando más hectáreas, vendiendo o moviendo ganado) o suplementelos (rollos o granos). Al disminuir la rotación aumentan los días por parcela y hace que los animales coman más al ras y tengan menor ganancia. El futuro rebrote de esas parcelas "sobrepastoreadas" se verá comprometido y será más lento.

**5) Mire al tiempo:** Una lluvia que se aproxima puede ser señal de la necesidad de mover de leguminosas puras a pasturas consociadas y de más edad, para prevenir que se pisotee la tierra y dañe a las leguminosas.

**6) Finalmente, mire al calendario:** Durante la época activa de crecimiento (octubre-abril), se debe manejar la altura del forraje residual para permitir un rebrote rápido. Durante el otoño y el invierno almacene la pastura, que los animales pastorearan por más tiempo y más al ras en cada parcela para utilizar forraje que de cualquier forma se perdería durante el frío.

Volver a: [Sistemas de pastoreo](#)