

EL PALQUE, CARACTERÍSTICAS GENERALES

Garay, J.A. y Veneciano, J.H.. 2006. Informativo Rural, E.E.A San Luis, 3(8).

www.produccion-animal.com.ar

Volver a: [Intoxicaciones](#)

INTRODUCCIÓN

El duraznillo negro o palque (*Cestrum parqui* L'Hérit.) (Figura 1) es una de las plantas tóxicas de mayor impacto económico en gran parte de la región ganadera nacional, extendiéndose su presencia desde el Río Colorado hasta Jujuy (Figura 2). Su toxicidad se conoce desde hace mucho tiempo: cada año se registran numerosos casos de intoxicaciones en el ganado bovino, que resultan mortales u ocasionan afecciones de difícil recuperación a los animales sobrevivientes. Ha sido asimismo muy utilizada como planta medicinal.

Ampliamente difundido en la formación del Espinal, incluido el centro este de San Luis, el duraznillo negro vegeta en las abras, a orillas de ríos, caminos, en zonas de desmonte, aunque más frecuentemente en hábitats umbríos, bajo la cobertura de especies leñosas tales como chañar, caldén, peje y algarrobo.




Figura 1.- Planta de palque en estado vegetativo.

DESCRIPCIÓN

Es un arbusto de la familia *Solanaceae*, de 0,6 - 2,5 m de altura, rizomatoso, con tallo leñoso erguido, muy ramificado; hojas simples y alternas, de forma lanceolada, con el nervio central prominente, que despiden un intenso olor desagradable al frotarlas.




Figura 2.- Distribución del palque en el territorio argentino.

Las flores, de color amarillo, son tubulares: presentan una corola estrellada, con cinco lóbulos dispuestos sobre un tubo cilíndrico (Figura 3), y los frutos son ovoides, de color negro violáceo cuando maduros. Tiene reproducción sexual y también vegetativa, diseminándose principalmente por la acción de pájaros.



Figura 3.- Detalle de la flor del palque.

Rebrota a fines del invierno y florece en diciembre-enero, aunque puede presentar flores hasta el final del verano. Con las primeras heladas comienza a perder sus hojas.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

- Bedotti, D.O. 2004. Intoxicación de rumiantes por *Cestrum parqui* (duraznillo negro). In: INTA, Estudios sobre sanidad animal en la provincia de La Pampa. Public. Técnica 58: 49-50.
- Garay, J.A. y Sager, R.L. 2001. El palque o duraznillo negro. Rev. de la Soc. Rural de Jesús María n° 124: 24-25.

[Volver a: Intoxicaciones](#)