

RESEÑA TÉCNICA

Buenas prácticas para aplicar la cápsula Rumensin® Bolos



Elanco. 2016. Información Laboratorio.
www.produccion-animal.com.ar

Volver a: [Enfermedades metabólicas de los bovinos; empaste](#)

Guía de aplicación

- Almacene las cápsulas a temperatura ambiente (15-30°C) antes del uso.
- Pese el ganado antes de la aplicación. Todos los animales deben pesar más de 200 kg.
- Aplique la cápsula utilizando el aplicador.
- Coloque al animal en un cepo. Tenga cuidado que el cepo sea adecuado para el tamaño del animal.
- Registre el número de identificación de cada animal junto al correspondiente número de cápsula.
- Tomando las aletas por el medio, doble ambas aletas sobre la cápsula (Figura 1A) e insértela con las puntas de las alas apuntando hacia el exterior del aplicador (Figura 1B).
- Extienda la cabeza y el cuello del animal hacia adelante y sostenga la cabeza firmemente contra su costado.
- Asegure al animal con una mano en la comisura de la boca del animal.
- Inserte el aplicador hacia el costado de la boca del animal (Figura 2), rótelo y empújelo hacia el fondo de la garganta deslizándolo sobre la lengua para evitar contacto con los dientes (Figura 3).
- Cuando el animal traga, presione la varilla para expulsar la cápsula (Figura 4).
- Si el animal se resiste retire el aplicador suavemente y repita el procedimiento.

Precauciones

- NO ADMINISTRE las cápsulas con las aletas rotas o dobladas. Devuélvalas a Elanco para que sean reemplazadas.
- NO ADMINISTRE las cápsulas a ganado que pesa menos de 200 kg.
- NO USE fuerza o velocidad excesiva. Tómese su tiempo para aplicar cada cápsula como corresponde.
- NO SIGA adelante si tiene problemas en la aplicación de las cápsulas o si los animales regurgitan las cápsulas de manera regular inmediatamente después de su aplicación.
- NO RE-APLIQUE las cápsulas regurgitadas luego de encerrar al animal.




Figura 1: Pliegue ambas aletas contra la cápsula e insértela en el aplicador.



Figura 2: Inserte con cuidado el aplicador en el costado de la boca del animal.



Figura 3: Empuje el aplicador hasta el fondo de la garganta del animal deslizándolo sobre la lengua.



Figura 4: Cuando el animal traga, presione la varilla para liberar la cápsula.

Guía de gestión

- Aplique la Cápsula Rumensin® al menos una semana antes de que el ganado sea ingresado a pasturas que pueden causar empaste.
- Mantenga encerrado al ganado al menos una hora luego de la aplicación para observar posibles regurgitaciones o signos de atragantamiento.
- Si el animal regurgita la cápsula mientras está encerrado luego del tratamiento, verifique a qué animal corresponde el número de cápsula y vuelva a tratarlo con una cápsula nueva.
- Controle el ganado durante tres o cuatro días luego del tratamiento para detectar signos de atragantamiento en el esófago. Los signos de atragantamiento incluyen salivado, extensión frecuente de la cabeza y el cuello, beber grandes cantidades de agua, mantenerse cerca de fuentes de agua, rápida pérdida de peso y retardo de crecimiento.
- Si sospecha atragantamiento, contacte de inmediato a su veterinario y a Elanco.
- Siga controlando el rodeo para detectar la posible ocurrencia de empaste luego de la aplicación. Tenga en cuenta que ningún producto brinda una protección total.
- Contacte a su veterinario si observa síntomas de empaste en el ganado.

Contáctenos si tiene algún problema

Contacte de inmediato a la veterinaria local, al representante de Elanco:

- Si desea recibir capacitación en el campo.
- Si el paquete contiene cápsulas con aletas rotas o dobladas.
- Si le resulta difícil administrar las cápsulas o si los animales regurgitan las cápsulas inmediatamente después de la administración.
- Si encuentra cápsulas regurgitadas durante el período de vigencia de las mismas.
- Si encuentra cápsulas regurgitadas luego del período de vigencia con tabletas adentro.

Elanco tiene un compromiso con sus clientes y nos es grato recibir sus comentarios acerca del desempeño de nuestros productos. Sus comentarios nos brindan información sobre cómo continuar ofreciendo el más alto nivel de satisfacción y seguridad del producto.



Elanco Animal Health

Una División de Eli Lilly y Compañía
Tronador 4890 Piso 12
C1430DNN, CABA
Buenos Aires, Argentina
Tel.: 0800-777-ELANCO (352626)
pedidoselanco@elanco.com

SCRCTRLRAC00019

Elanco®, Rumensin® y la barra diagonal son marcas registradas y autorizadas de Eli Lilly y Compañía.

Volver a: [Enfermedades metabólicas de los bovinos; empaste](#)