

# CESÁREA POR HIDROAMNIOS

Bavera, Guillermo A. 1976.  
[gbavera@produccion-animal.com.ar](mailto:gbavera@produccion-animal.com.ar)  
[www.produccion-animal.com.ar](http://www.produccion-animal.com.ar)

Volver a: [Comunicaciones de la Práctica Rural](#)

Hemos comprobado en un rodeo Shorthorn, propiedad de la familia Rostagno, Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto, Córdoba, un porcentaje elevado de hidroamnios comparado con los casos zonales. En este rodeo las hembras estaban permanentemente en una CC 4 a 5 (escala 5 puntos). Los casos variaban en su gravedad y se observaron en varios años seguidos.

En un caso extremo (se comprobó 120 litros de líquidos) fue necesario efectuar una cesárea anticipada, casi a término, pues la vaca ya no podía estar de pie por ahogarse a raíz del elevado tamaño y peso en el vientre que impedía el normal funcionamiento de los músculos respiratorios. El ternero sobrevivió y la vaca demoró unos 30 días en normalizarse.



Hidroamnios de 120 litros. a) antes de la cesárea; b) después de la cesárea. Campo Rostagno, Cnel. Moldes, pcia. de Córdoba. Intervino Méd. Vet. Guillermo Bavera; ayudante el entonces estudiante (hoy Méd. Vet. y Profesor) Carlos Errecalde.

Volver a: [Comunicaciones de la Práctica Rural](#)