

# PRÁCTICA DE LA PALPACIÓN RECTAL

Bavera, G. A. y C. Peñafort. 2000. Cursos de Producción Bovina de Carne, FAV UNRC.

[www.produccion-animal.com.ar](http://www.produccion-animal.com.ar)

Volver a: [cría](#)

Con la palpación o tacto rectal es más fácil predecir el momento del parto con exactitud al examinar un animal recientemente preñado, que al hacer la palpación en etapas intermedias o finales de la gestación. El valor de la palpación rectal alcanza su máxima expresión económica entre los 40 y 90 días de gestación, pero mantiene su valor diagnóstico hasta el momento del parto.

La palpación rectal exige un veterinario al pie de los animales, con un entrenamiento mínimo para reducir al máximo los posibles errores de diagnóstico y de abortos por malas maniobras.


Se debe contar con buenas instalaciones para el trabajo con rodeos medianos a grandes, tales como manga, cepe, apretavacío, puerta de tacto, tranca alta posterior al operador, tambor de aparte y corrales de encierre y aparte.

Es conveniente un encierre sin comida de las hembras a palpar de un mínimo de 12 hs para disminuir el contenido del tracto intestinal y facilitar el trabajo. Si la pastura donde se encontraban las hembras es verde, con éste encierre generalmente no será necesario que el veterinario vacíe el recto antes de proceder al diagnóstico. Si la alimentación es muy seca, especialmente en invierno en pasturas naturales diferidas, puede ser necesario efectuar el vaciamiento del recto, ya que se forman a veces verdaderas boñigas duras que impiden la palpación. Al vaciar el recto, el mismo se balona por la entrada de aire y sus paredes quedan en tensión, por lo que es necesario, antes de palpar, tomar uno de sus pliegues y hacer varias tracciones para eliminar el balonamiento. Esta complicación retrasa el trabajo y cansa al veterinario, disminuyendo su rendimiento y precisión.

Siempre es conveniente que el profesional trabaje con guantes largos de tacto para evitar infecciones en manos y brazos, incluso hasta tétano. En zonas áridas, se pueden encontrar espinas en la materia fecal, que por otra parte es muy seca. El guante ayuda a evitar heridas por las mismas y además, cuando el tacto se hace en invierno con temperaturas bajas, resulta penoso para el profesional trabajar a brazo descubierto, especialmente mientras espera entre vaca y vaca.

Completa el equipo del veterinario un guante tipo industrial en la mano que no palpa, botas de goma, guardapolvo, mameluco y/o delantal impermeable, agua de preferencia caliente y jabón de lavar en pan para lubricar el guante de tacto.

Es conveniente identificar las hembras vacías, ya que generalmente son las menos, por posibles mezclas que se pueden producir en los corrales de aparte o a posterior en los potreros. Si las vacas no están identificadas en forma que se pueda distinguir a distancia (caravana colgante numerada o número a fuego), y aún si lo están, el método más común y efectivo para diferenciar a distancia, a campo o en la manga, los distintos lotes que se forman durante el tacto, es el corte del mechón de crines de la borla de la cola, ya sean todas las crines o parte de ellas y los pelos del encole. En esta forma, se pueden diferenciar hasta siete lotes:



**Cola entera:** Se dejan intactas las crines de la cola. Generalmente se emplea para las vacas preñadas, que son mayoría.

**Cola cortada:** se corta en forma horizontal la totalidad de las crines de la borla al ras de la última vértebra coxígea. Generalmente se emplea para las vacas vacías.

**Media cola o mecha o media melena:** se corta en forma horizontal la mitad de las crines de la borla al ras de la última vértebra coxígea, quedando la otra mitad intacta.

**Mecha central, pichana o pollera:** Se cortan en forma horizontal las crines externas de la borla, dejando un manojito chico central intacto.

**Cola pelada o marlo o chaira:** Se pela la punta de la cola y últimas coxígeas, quedando el cuero a la vista.



**Preinforme**

Establ:		Rodeo:		Fecha:	
Cabezas	%	Marca cola	A lote	Observaciones	
Tactadas					
Preñadas					
Vacías					
Distribución preñez					
	Cabezas	%	Marca cola	Observaciones	
Preñez grande					
Preñez media					
Preñez chica					
CUT					
Total preñadas		100 %			

Este es sólo un ejemplo de Preinforme. Cada veterinario debe armar su propio modelo. Lo importante es no dejar de hacerlo.

Volver a: [cría](#)