

Volver a: [Producción Caprina](#)

OBSERVACIONES SOBRE MANEJO REPRODUCTIVO

INTRODUCCIÓN

En nuestras visitas a los productores de la zona, beneficiados con el Proyecto, hemos podido comprobar que sus cabras tienen 2 períodos definidos de parición: Mayo/Julio y Noviembre/Diciembre, como consecuencia de que los chivos padres están todo el año en el rebaño con las cabras. Si bien esto es beneficioso, en cierta forma, porque permite que algunas madres tengan 2 pariciones en el año, otras veces perjudica la eficiencia futura, ya que ciertas cabrillas que aún no han completado su desarrollo, quedan preñadas.

Aunque reconocemos que en muchos casos es prácticamente imposible mantener a los castrones separados del rebaño por falta de instalaciones adecuadas, recuerde que si Ud. no controla las montas, tendrá varios problemas como:

1. No aprovechará a pleno los mejores animales.-
2. No podrá alimentar selectivamente a las hembras preñadas o lactantes.-
3. No sabrá calcular las fechas de los nacimientos.-

Por lo tanto, es importante que conozca las ventajas que tiene en la eficiencia del rebaño la **Monta Controlada**:

Este sistema le permitirá elegir los mejores machos y saber después cuales cruzamientos le han producido las mejores crías. Para ello proceda así:

1. Coloque al macho en un corral y haga entrar a las hembras por turno, anotando los datos en un cuaderno.
2. Si no pudiera hacer una monta controlada, junte a las hembras con el o los chivos en un potrero. En este caso sólo sabrá la fecha para calcular el parto, pero no podrá conocer cuales cruzamientos producen mejores crías.
3. Mantenga separadas a las cabrillas de los machos. Hágalas montar solamente cuando tengan el peso adecuado (30 Kg). Recuerde que si les da servicio demasiado pronto, obtendrá poca leche, crías débiles o muertas y resentirá su desarrollo futuro.

El peso, por lo tanto, es más importante que la edad para el primer servicio. Técnicamente 15 meses es la edad adecuada para la primera monta, siempre y cuando la cabrillona haya recibido una buena alimentación, que le haya permitido alcanzar el peso adecuado.

CELO

Usted seguramente habrá visto muchas veces hembras en celo (altivas) y sabrá reconocerlas, de cualquier forma, repasemos sus signos:

- ◆ Mueven la cola exageradamente.
- ◆ Balan con frecuencia.
- ◆ Se montan entre ellas.
- ◆ Pierden el apetito.
- ◆ Orinan con frecuencia.
- ◆ Tienen la vulva inflamada y con secreción.

Recuerde que:

- ◆ El momento más apropiado para la monta es el 2° día del celo.
- ◆ Para cabras adultas, un solo salto es suficiente para que queden preñadas.
- ◆ Para las cabrillonas que se cruzan por primera vez, es más seguro que tengan dos saltos.

¿ Que hacer si una hembra no entra en celo?

- ◆ Puede ser que este preñada.

Si no fuera así:

- ◆ Póngala directamente en contacto con el chivo padre o frote un paño detrás de los cuernos o en la barba de un macho, ponga el paño en un bolsa o en un frasco y haga que la hembra tome el olor.

Por todo lo dicho, es fundamental que anote en un cuaderno los datos más importantes de los servicios (registro de monta).

- ◆ Nombre de la cabra
- ◆ Fecha del servicio
- ◆ Nombre del macho
- ◆ Fecha probable del parto
- ◆ Crías
- ◆ Cantidad de leche producida

De esta forma sabrá:

- ◆ Qué padres dan las mejores crías
- ◆ Cuando serán los nacimientos
- ◆ Qué cabras son las mejores madres y más lecheras
- ◆ Cuántas crías tuvieron

Para calcular la fecha probable del nacimiento agréguele al día del servicio 5 meses y réstele 3 días.

ASÍ PODRÁ PREPARAR A LA CABRA PARA UN PARTO EN BUENAS CONDICIONES

CUIDADOS DESPUÉS DEL SERVICIO

Después de la monta, junte a las cabras con el resto del rebaño.

Si a los 21 días vuelve a entrar en celo, crúcela otra vez. Si no, preste atención a los signos de preñez.

Recuerde siempre que la alimentación debe ser buena, especialmente en los últimos 50 días, para que tenga buena bajada de leche y el cabrito nazca con un peso adecuado, que le permita tener una rápida evolución.

Por lo tanto:

Si la cabra preñada esta siendo ordeñada, séquela a los 3 meses de gestación. Para eso, directamente deje de ordeñarla y retírele el agua por 1 día.

Volver a: [Producción Caprina](#)